

Implantaadid

Miks on oluline puuduvad hambad asendada?


- Pika aja jooksul hamba asendamata jätmise korral kalduvad kõrval olevad hambad tühimiku suunas ja tekib ruumipuudus, mis võib takistada hilisemat hamba asendamist proteesiga. Samuti hakkab oma kohalt välja vajuma vastashammas.
- Puuduva hamba piirkonnas tekib aja möödudes luukadu, mis raskendab hilisemat proteesimist.
- Probleemsel suu poolel vähenevad mälumiskontaktid, mistõttu võib inimene hakata süüa rohkem teise suupoolega. See omakorda võib viia alalõualiigeste vaevusteni.
- Tagumiste hammaste puudumise korral on suurem mälumiskoormus eeshammastel, mis viib nende suurema kulumise ja asendimuutusteni.

Mis on implantaat?

Implantaat on titaansulamist tehisiuur, mis asetatakse lõualuusse ja millega saab sisuliselt asendada inimese enda hambajuure. (Pilt 1). Luustumisperioodi järgselt kinnitatakse implantaadi külge patsiendi oma hamba kuju ja funktsiooniga hambakroon.

Kui asendamist vajab kolm või enam hammast, võib valmistada implantaatsilla. Selle lahenduse puhul on kroonid üksteisega seotud ja sõltuvalt tühimiku suurusest toetab neid stabiilne kahest või enamast implantaadist koosnev alus. Viide pildile 2.

Patsientidel, kelle üla- või alalõuas puuduvad kõik hambad, on võimalik asendada terve hambakaar neljale kuni kaheksale implantaadile toetuva proteesi abil. Viide pildile 3.



Pilt 1

Pilt 2

Pilt 3

Millal ja miks implantaati eelistada?

- Implantaat on parim lahendus puuduva hamba või hammaste asendamisel kui:
- soovitakse mugavat, suhu fikseeritud lahendust, mis oleks võimalikult oma hammaste moodi;
- ei soovita kõrval olevate hammaste lihvimist, mida eeldab näiteks sildade paigaldamine;
- ei saa või ei taha kanda suust eemaldatavat proteesi.

Kuidas implantaat suhu asetatakse?

Enne implantaadi paigaldamist viiakse läbi põhjalik analüüs, kus hinnatakse lõualuu, ülejäänud hammaste ja igemete tervislikku seisundit, hambumust ning võimalikke vastunäidustusi (halb suuhügieen, rohke suitsetamine, rasked üldhaigused või ainevahetushäired, keemia-ja kiiritusravi).

Kui olemasoleva luu kvaliteet ja maht ei ole implantaadi paigaldamiseks piisav, on mõnel juhul vajalik luusiirdamine. Ülalõuas võib see tähendada põskkoopapõhja tõstmist. Luusiirdamine toimub enne implantaadi asetamist või implantatsiooni ajal. Mõnikord on vaja siirdada ka igemekude, seda eriti eeshammaste piirkonnas. Enne operatsiooni tuleb kindlasti ravida katkised hambad ja igemehaigused ning mõnikord korrigeerida hambumust.

Teatud juhtudel on võimalik implantaat paigaldada kohe pärast hamba eemaldamist, kuid enamasti on siiski vaja oodata 2–3 kuud, kuni piirkond luustub. Hambaimplantaat asetatakse suhu ühe visiidiga ning seda tehakse kohaliku tuimestuse all. Seejärel vajab implantaat 3–6 kuud, et lõualuus korralikult luustuda – täpne aeg sõltub implantaadi asukohast ja luu seisukorrast. Hambakroon kinnitatakse implantaadile pärast luustumisperioodi lõppu.

Riskid ja komplikatsioonid operatsiooni ajal ning vahetult pärast operatsiooni

- Põletik haavas ja implantaadi ümber, eriti suitsetajatel ja halva suuhügieeniga inimestel.
- Implantaadikruvi paljastumine liiga õhukese igeme korral.
- Alalõuas asuva kolmiknärvi vigastus, mille tagajärjeks võib olla tundlikkuse kadumine alahuules või lõua sellel poolel, kus kahjustus tekkis.
- Põskkoopas limaskestast vigastamine põskkoopapõhja tõstmise protseduuri ajal. Enamasti saab protseduuri siiski edukalt lõpetada viia, kuid mõnikord on vaja operatsioon lõpetada ja protseduuri korratakse mõne kuu pärast, kui limaskest on paranenud.
- Põskkoopapõletik.

Implantaatide eluiga

Implantaati asetades eeldatakse, et kruvi püsib lõualuus probleemideta aastakümneid. Enamasti see nii ka on, kuid mõnikord võivad siiski tekkida probleemid. Kõige sagedamini võib implantaadi ümber tekkida periimplantiit. Tegemist on põletikulise protsessiga, mis tekitab luukadu ja võib lõppeda implantaadi kaotusega. Periimplantiidi raviks puhastatakse implantaadi pind ja probleemid enamasti kaovad. Implantaadi eemaldamine on vajalik vaid äärmuslikul juhul. Aastate jooksul tuleb välja vahetada implantaadile toetuv protees.

Implantaatide suuhooldus

Pikaajalise tulemuse saavutamiseks on oluline patsiendi väga hea suuhügieen. Ainuüksi hambaharjast jääb suuõõne ja hammaste korralikuks puhastamiseks väheks. Igapäevaselt tuleb kasutada hambaniiti või hambavaheharjasid. 1–2 korda aastas tuleb külastada hambaarsti ja/või suuhügienisti ning lasta teha hammastele korralik puhastus, mille käigus eemaldatakse hambakivi, -katt ja pigment. Vastasel korral on suurem risk periimplantiidi tekkeks.

Järelmaksu võimalus

Vahel juhtub, et tervisemure lahendamise eest ei ole võimalik koheselt tasuda. Pakume koostööpartner MediCrediti abil hambaravi eest tasumiseks järelmaksuvõimalust. Nii saate ravi eest tasuda osade kaupa, vastavalt oma võimalustele. Täpsemad laenuitingimused leiate meie veebilehelt hinnakirja rubriigist.