

Narkoosis hambaravi

Mis on narkoos?

Narkoosi ehk anesteesiat kasutatakse operatsioonide ja valulike protseduuride ajal, et lülitada välja teadvus ja valutundlikkus kehas. Narkoosi ajal viibib patsient rahulikus unetaolises seisundis. Narkoosis hambaraviks kasutame üldanesteesiat, mille viib läbi anesthesioloog.

Narkoosis hambaravi on sobilik patsiendile kellel on:

- väga halvas olukorras hammaskond;
- suur hirm hambaravi protseduuride ees;
- soov ravida mitu hammast ühel visiidil k.a mitme tarkusehamba samaaegne eemaldamine;
- keerulised kirurgilised protseduurid;
- hambaravi takistav tugev okserefleks;
- füüsiline või vaimne erivajadus.

Kuidas toimub narkoosis hambaravi?

Selleks, et tekitada pingevaba keskkond ja vähendada protseduurist tingitud ärevust, manustame esialgu nina kaudu rahustava toimega ravimit. Läbi spetsiaalse maski manustatakse narkoosigaasi, mille abil jääb patsient mõne minuti jooksul „magama“.

Peale uinumist manustame veeni kaudu narkoosiks vajalikud ravimid ja asetame suu või nina kaudu hingamisteedesse hingamistoru. Selle kaudu saab patsient narkoosi ajal hapniku ja narkoosigaasi segu.

Enne narkoosis hambaravi

- Palun saabuge protseduurile kokkulepitud ajaks ja riietuge mugavalt.
- Narkoosi päeva hommikul ei tohi süüa ega juua. Viimasest söömisest ja joomisest peab olema möödas vähemalt 6 tundi, et maosisu ei satuks narkoosi ajal hingamisteedesse ja põhjustaks eluohtlikke tüsistusi.
- Protseduurile ei ole lubatud tulla haigusseisundis sh palaviku, köha või nohuga.
- Enne protseduuri palume teil kinnitada, et olete tutvunud võimalike kõrvaltoimetega ning saate aru anesteesiameetodi olemusest ja võimalikest riskiteguritest ja tüsistustest.

Narkoosijärgne periood

Operatsiooni järgselt toibute anesteesiast ärkamisruumis, kus jälgitakse Teie hingamist, pulssi, vererõhku. Vajadusel manustatakse valuvaigisteid.

Ohutuks koju jõudmiseks on vajalik saatja. Teovõimeline täiskasvanu peab Teie läheduses viibima 24 tunni jooksul pärast operatsiooni. Pärast narkoosi ei tohi Te 24 tunni jooksul juhtida mootorsõidukit.

Kui suus on haavad, siis tuleb olla söömisega ettevaatlik. Värske haav on tundlik kuumale, hapule, soolasele ja tahkele toidule. Vältige järgmistel päevadel liigset füüsilist koormust.

Kuigi üldanesteesia on küllaltki ohutu, hõlmab see endas teatud riske. Anesteesia kõrvaltoimed ja tüsistused on:

- iiveldus, nõrkus ja uimasus, peavalu ning lihaste valulikkus;
- hammaste, keele, huulte pindmised vigastused hingamistoru panekul;
- harvadel juhtudel võib esineda ärkvelolekut anesteesia ajal.

Narkoosis hambaravi teostatakse Tallinnas Meliva Järve hambakliinikus aadressil Lelle 24 ja Pärnu hambakliinikus aadressil Väike-Kuke 4b.

